

СОМАТИК ПАТОЛОГИЯДА АКУШЕРЛИК ВА ПЕРИНАТАЛ ЖИҲАТЛАР



Илмий-амалий конференция материаллари

т.ф.д., профессор А.А. Қодирова

ҳотирасига бағишланади

Тошкент 5.03.2024й.



Ассоциация
акушеров-
гинекологов
Узбекистана



Центр развития
профессиональной
квалификации
медицинских
работников РУз



Министерство
здравоохранения
Республики
Узбекистан



Ташкентская
медицинская
академия



Ташкентский
медицинский
педиатрический
институт



Ташкентский
государственный
стоматологический
институт

Акушерские и перинатальные аспекты при соматической патологии

*научно-практическая конференция с международным участием,
посвящается памяти профессора А.А. Кадировой*

Сборник Тезисов

Ташкент – 5.03.2024г.

позволяют заключить, что сохранение динамического равновесия в системе цитокинов играет важную роль для нормального развития беременности. Процесс изменения уровня цитокинов при неосложненной беременности является важным звеном адаптационной реакции организма женщины.

COVID-19 АНИҚЛАНГАН ХОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ХОМИЛАДОРЛИК КЕЧИШИ ВА ТУГРУК АСОРАТЛАРИ

Сулаймонова Н.Ж., Абдурахманова С.И.
Тошкент Давлат Стоматология институти. Тошкент,
Ўзбекистон.

Долзарблиги: Сўнгги 3 йил ичида ҳомиладорлик ва COVID-19 энг актуал муаммолардан бирига айланди. Чунки COVID-19 натижасида ҳомиладорлик даврида учрайдиган гестацион кандли диабет, муддатдан олдинги туғрук (39%), ҳомилани ривожланишдан орқада қолиши (10%), ҳомиланинг ўз-ўзидан тушиши (4%), кесар кесиш (77%), ҳомила дистресси (66%) чақалоқ асфиксияси, ҳомила ичи инфекцияси, фетоплацентар етишмовчилик билан туғилиш сони ошди.

Тадқиқот мақсади: COVID-19 аниқланган ҳомиладор аёлларда ҳомиладорлик кечиши ва туғруқ асоратларини ўрганиш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари: Биз COVID-19 билан оғриган ҳомиладор аёлларда ҳомиладорлик кечиши ва касаллик натижасида юзага келадиган асоратларни ўргандик. Асосий гуруҳга COVID-19 кузатилган 35 ҳомиладор аёл, назорат гуруҳига эса ҳомиладорлик даври асоратсиз кечаётган 20 нафар аёл киритилди. Тадқиқотларда ҳомиладорликнинг III триместрида коагулограмма, бачадон-йўлдош қон оқими доплерометрияси, доимий назорат ўтказилди.

Асосий гуруҳдаги ҳомиладор аёллар 21 ёшдан 35 ёшгача оралиқда бўлиб, ўртача $27,4 \pm 1,26$ ёшни ташкил қилди ва таққослаш гуруҳининг $26 \pm 2,54$ ёш кўрсаткичларидан деярли фарқ қилмади.

Хомиладорликнинг III триместеридаги коагулограмма натижаларига кура ПТИ курсаткичлари асосий гуруҳда 10-15% кўтарилган, бу гиперкоагуляция ҳисобига содир булади. БЙХТҚАБ (бачадон-йўлдош-хомила тизими қон айланиши бузилиши) доплерометрия кўрсаткичлари бўйича асосий гуруҳда турли даражада БЙХТҚАБ 30-40% аёлларда кузатилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси: Асосий гуруҳдаги ҳомиладор аёлларда БЙХТҚАБ 10 ҳолатда, назорат гуруҳида эса 4 тани, ҳомила ичи дистресси 8 ва 2 ҳолатда, чақалоқлар асфиксияси 3 ва 1 ҳолатда, ҳомила ичи инфекцияси 20 ва 5 ҳолатда кузатилди. Ўтказилган тадқиқотлар давомида асосий гуруҳ беморларида ҳомиладорликнинг эрта муддатларда хомиланинг тушиш хавфи, ҳомиладорлик физиологик кечаётган аёллардагига нисбатан сезиларли даражада кўп учраши аниқланди (асосий гуруҳда - 44,2% назорат гуруҳида - 10,7%, $p<0,05$). Морфологик тадқиқот натижалари, назорат гуруҳига нисбатан солиштирилганда, статистик жиҳатдан аҳамиятли тафовут борлигини кўрсатди ($p<0,05$).

Янги туғилган чақалоқларнинг қониқарли ҳолати (Апгар бўйича 7/8 балл) назорат гуруҳида кўпроқ қайд қилинган бўлса - 73,5%, бачадон-йўлдош қон айланиши бузилиши аниқланган гуруҳда бу кўрсаткич 19,2%ни ташкил қилди ($p<0,05$).

Гипоксия ҳолати (Апгар бўйича 6/7 балл) БЙХТҚАБ (бачадон-йўлдош-хомила тизими қон айланиши бузилиши) аниқланган асосий гуруҳ чақалоқларида кўпроқ учради - 67,8%, назорат гуруҳида эса ўртача гипоксия ҳолати 32,5% болада қайд қилинди.

Текширувлар натижасида турли даражадаги асоратлар аниқланган бўлсада, оналар ўлими ва неонатал ўлим ҳолатлари кузатилмади.

Хулоса: COVID-19 оналар ва янги туғилган чақалоқларда ҳомиладорлик ва туғруқ жараёни касалликка чалинмаган аёлларга нисбатан асоратли ва оғирроқ кечади. Хомиладорликнинг барча босқичларида ҳомиладор доимий текширув ва назорат остида бўлиши талаб этилади. Чунки манбаларда тасдиқланишича

ҳомиладорликнинг айниқса III триместрида кўп ҳолларда касаллик симптомсиз кечиши кузатилган.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКЦИИ ЦИТОКИНОВ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Турдыева Д.О., Хамдамов Б.З.

Бухарский государственный медицинский институт

Цитокины традиционно являются предметом особого внимания со стороны исследователей, занимающихся проблемами иммунологии репродукции, что связано с их участием в осуществлении практически всех этапов гестационного процесса. Причем на протяжении беременности значимость тех или иных факторов изменяется, что обусловлено особенностями этапов формирования плаценты и изменением популяционного состава клеток-продуцентов цитокинов в динамике гестационного процесса.

Цель исследования— провести сравнительный анализ продукции цитокинов при физиологически протекающей беременности в зависимости от срока гестации.

Материал и методы. Были обследованы 77 женщин с физиологически протекающей беременностью со сроком гестации: 25 женщин в I триместре беременности, 26 женщин – во II триместре и 26 женщин в III триместре гестации. Контрольную группу составили 23 практически здоровых женщин репродуктивного возраста. Изучали уровни провоспалительных (ИЛ-1 β , ИЛ-6, ИЛ-8), противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа. Использовали тест-системы ООО «Цитокин» (СПб, Россия).

Результаты. Полученные нами данные свидетельствуют, что в первом триместре беременности продукция про- и