





ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ПСИХОСОЦИАЛЬНУЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Матвеева А.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность

На сегодняшний день существует ограниченное количество исследований, посвящённых проблеме эмоционального интеллекта у пациентов с шизофренией [4, 6, 10]. В одних работах основное внимание уделяется нарушениям эмоциональной сферы у данной категории пациентов, а также их взаимосвязи с социальной ангедонией, отдельными клиническими симптомами заболевания и нейрокогнитивными дефицитами [1, 3, 5]. Другие исследования сосредоточены на расстройствах социального познания при параноидной форме шизофрении, рассматривая эмоциональный интеллект как интегральную часть этого процесса [2, 8, 11].

Актуальность изучения эмоционального интеллекта у лиц с шизофренией обусловлена тем, что в данной группе нередко наблюдаются выраженные трудности в распознавании и осознании как собственных, так и чужих эмоций. Подобные нарушения существенно затрудняют процессы социальной адаптации, способствуя формированию социальной отчуждённости, проявляющейся в замкнутости и формальности межличностных контактов [5, 7, 9, 12].

Цель исследования

Изучение психосоциального функционирования пациентов параноидной шизофренией с учётом показателей эмоционального интеллекта.

Материал и методы

Обследовано 128 пациентов с параноидной шизофренией (56 мужчин и 72 женщины) в возрасте от 20 до 50 лет, проходивших стационарное лечение в клинической психиатрической больнице города Ташкента.

В ходе исследования использовались клинико-патопсихологический, катамнестический и психометрические методы. Для оценки различных аспектов состояния применялись следующие диагностические инструменты:

- опросник качества жизни ВОЗ КЖ-СМ (WHOQOL-BREF),
- шкала краткой оценки когнитивных функций у пациентов с шизофренией (BACS),
 - тест эмоционального интеллекта Н. Холла.







Результаты

При анализе средних значений было установлено, что показатели всех характеристик эмоционального интеллекта у женщин и мужчин, больных шизофренией, в основном, низкие, что является одним из факторов риска неэффективного взаимодействия с другими людьми. В результате сравнительного анализа между больными женщинами и мужчинами, были выявлены значимые различия в способностях управлять чужими эмоциями (t=2,6; p <0,01) и понимать эмоции других людей (t=2,1; р<0,05). В ходе проведённого исследования был осуществлён анализ показателей нарушений социального функционирования пациентов, а также субъективной стороны их переживаний, связанных с состоянием психического здоровья. Установлено, что запрет на выражение чувств способствует отчуждению больными собственных эмоциональных состояний, что вызывает внутренний дискомфорт, растерянность и затруднения в осознании собственного психоэмоционального состояния, а в тяжёлых случаях - развитие симптомов деперсонализации.

Зафиксировано прогрессирование нарушений эмоциональной сферы и выраженная социально-психологическая дезадаптация, приводящая к снижению эффективности межличностного взаимодействия. Полученные результаты указывают на резкое снижение способности пациентов точно идентифицировать эмоциональное состояние партнёра по общению.

В ходе анализа особенностей эмоционального интеллекта выявлено, что дисбаланс между эмоциональной и когнитивной регуляцией обусловлен формированием общего психологического механизма, нарушающего целостность психической адаптации.

Выводы

Таким образом, снижение показателей эмоционального интеллекта у пациентов с параноидной шизофренией с учётом гендерных различий отражает более выраженную тяжесть негативной симптоматики у женщин. В частности, это проявляется в обеднении эмоциональной сферы, эмоциональной тупости, нарастании апатии, аутизации и амбивалентности. Полученные данные о нарушенных и сохранных компонентах эмоционального интеллекта могут служить основой для выбора наиболее эффективных психокоррекционных и реабилитационных подходов. Кроме того, учёт гендерных особенностей позволяет более точно прогнозировать эффективность психотерапевтических интервенций и перспективы социальной адаптации пациентов.

Библиографические ссылки:

1. Абдуллаева В. К., Ирмухамедов Т. Б. Features of the structure and severity of cognitive disorders in patients with paranoid schizophrenia with concomitant cerebral and hemodynamic disorders //узбекский медицинский журнал. – 2021. – №. special 1.







- 2. Матвеева А. А. Роль эмоционального интеллекта у пациентов с параноидной шизофренией //Человеческий фактор: Социальный психолог. 2021. № 1. С. 468-472.
- 3. Матвеева А. А., Абдуллаева В. К. Гендерные особенности эмоционального интеллекта при параноидной шизофрении //VolgaMedScience. 2022. С. 424-426.
- 4. Матвеева А.А. Опыт применения интегративной танцевальнодвигательной психотерапии у подростков при нервной анорексии // Проблемы клинической психиатрии и наркологии в XXI веке Тула, 31 мая – 01 июня 2018 года, с.66-70.
- 5. Matveeva A.A. Typology of social intelligence disorders in patients with paranoid schizophrenia // Вестник интегративной психологии // Журнал для психологов. Вып. 31. Часть 2. /Под ред. В.В.Козлова, Ш.Р. Баратова, М.Н.Усмановой. Бухара Ярославль: МАПН, 2024. 483с.; с.244-247.
- 6. Matveeva A.A., Abdullaeva V.K., Aliyev B.A. Features of emotional intelligence disorders in patients with paranoid schizophrenia // New day in medicine, 2020, 4 (32), c. 232-235.
- 7. Matveeva A.A., Sultonova KB, Abbasova DS et al. Optimization of psychodiagnostics of emotional states // Danish Scientific Journal. VOL 3, No. 5 pp. 24-27.
- 8. Aleksey V. Rogov, Vasila K. Abdullaeva, Anastasiya A. Matveyeva, Parida F. Sharipova and Temur B. Irmukhamedov// Some Determinants of Disturbances of Social Functioning in Patients with Paranoid Schizophrenia with Related Viral Hepatitis// International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 05, 2020 p.425 433.
- 9. Rogov A.V., Matveyeva A.A., Abduqudusov A.O. Violations of the planning strategy in patients with paranoid schizophrenia with related viral hepatitis // The 2nd International scientific and practical conference Modern science: problems 145 and innovations|| (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020, p. 112-118.
- 10. Abdullaeva V.K. Non-suicidal self- injurious behavior in adolescents (literature review) // Science and innovation International scientific journal Volume 3 Issue 3 March 2024, pp. 93-99.
- 11. Сулейманов Ш.Р. Эффективность арт-терапии у пациентов с параноидной шизофренией // Современные тенденции в психиатрии и медицинской психологии: интегрированный подход к социальной психиатрии, лечению аддикций и повышению комплаенса, 2024, C.70-72
- 12. Abdullaeva, Vasila K., et al. "Premorbid features of patients with paranoid schizophrenia with concomitant cerebral hemodynamic disorders." European Journal of Molecular & Clinical Medicine 7.2 (2020): 2320-2327.
- 13. Туйчиев Ш. Применение опросника EQ-5D-5L для изучения качества жизни у больных, перенесших Ковид-19 //Современные тенденции в психиатрии и медицинской психологии: интегрированный







- подход к социальной психиатрии, лечению аддикций и повышению комплаенса. 2024. Т. 2. №. 2. С. 80-81.
- 14. Матвеева, А. (2024). Диссонанс эмоциональной и когнитивной регуляции у больных параноидной шизофренией. Современные тенденции в психиатрии и медицинской психологии: интегрированный подход к социальной психиатрии, лечению аддикций и повышению комплаенса, 2(2), 41–43.
- 15. Матвеева, А. (2024). Вопросы социальной адаптации больных параноидной шизофренией Современные тенденции в психиатрии и медицинской психологии: интегрированный подход к социальной психиатрии, лечению аддикций и повышению комплаенса, 2(2), 37–40.
- 16. Матвеева, А. (2023). Типология социо-эмоциональной дисфункции у больных параноидной шизофренией. Биопсихосоциальная психиатрия: новые подходы и перспективы развития, 1(1), 36–38.
- 17. Матвеева, А. (2023). Особенности течения параноидной шизофрении, сочетанной с соматической патологией. Биопсихосоциальная психиатрия: новые подходы и перспективы развития, 1(1), 33–35.
- 18. AA Matveeva, VK Abdullaeva. GENDER HETEROGENEITY OF THE NEUROCOGNITIVE PROFILE OF PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA. Medical Journal of Uzbekistan, 2024, C. 40-45
- 19. СН Акбарова, АА Матвеева. Наследственное отражение предпосылок агрессивности человека. Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. с. 103-105
- 20. Ганиханов, А. (2024). Эпидемиология психических расстройств. Современные тенденции в психиатрии и медицинской психологии: интегрированный подход к социальной психиатрии, лечению аддикций и повышению комплаенса, 2(2), 27–28.
- 21. Ганиханов А.А. Динамика эпидемиологии психических расстройств: статистические показатели и анализ инвалидности. Medical Journal of Uzbekistan, 2024
- 22. Rogov, A. V., & Abdullayeva, V. K. (2022, May). Determinant of social functioning in patients with paranoid schizophrenia with concomitant viral hepatitis. In materials of international scientific-practical conference (p. 73).
- 23. Шарипова, Ф. К., and Ш. У. Ахмедова. "Проблемы психоэмоционального развития детей и подростков с сахарным диабетом I типа." Вопросы психического здоровья детей и подростков 17.S2 (2017): 257-258.
- 24. Сулейманов, Ш. Р., С. Б. Бабарахимова, and А. А. Иноятов. "Профилактика суицидов у подростков." Антология российской психотерапии и психологии. 2019.
- 25. Турсунходжаева, Л. А., and Ж. Т. Рустамова. "Влияние преморбидных особенностей личности на скорость формирования зависимости от гашиша у больных опийно-гашишной полинаркоманией." Психическое здоровье 7.3 (2009): 44-47.