

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Абдулазизова Азиза, Саатова Хулкархон Музаффар кизи, магистры 2 курса

Научный руководитель: Наврузова Р.С.

ТашПМИ, кафедра акушерства и гинекологии, детской гинекологии.

Актуальность: Актуальность. Злокачественные новообразования (ЗН) в настоящее время продолжают оставаться одной из наиболее важных проблем клинической медицины несмотря на достигнутые успехи по ранней диагностике и лечению этой патологии. Если обратиться к статистике ЗН, лидирующее место в патологии женской репродуктивной системы после рака молочной железы занимает рак шейки матки (РШМ), являясь наиболее распространенной в среде онкогинекологических заболеваний.

Цель исследования: изучение онкоэпидемиологической ситуации РШМ в мире, динамики заболеваемости в Республике Узбекистан.

Материалы и методы: материалом для изучения и анализа служили статистические данные мировой статистики по Globocan.

Результаты исследования: Анализ заболеваемости и смертности от РШМ в мире по данным Globocan. Подробное изучение данных мировой статистики РШМ показали, что эта патология в структуре заболеваемости всех ЗН в мире находится на 7-м месте по смертности.

Анализ заболеваемости и смертности от РШМ в Республике Узбекистан.

Изучение «грубого» показателя заболеваемости РШМ по республике показал, что в среднем он не превышал - $9,0 \pm 0,10/0000$ на 100 тыс. женского населения с тенденцией к убыли $Tub = -0,13\%$, это констатирует имеющуюся стабильность общего показателя.

Как известно грубые показатели не дают возможности проводить сравнительную оценку состояния онкологической помощи и уровня его эффективности. В связи с этим, необходимо проводить перерасчет показателей на стандартизованные, т.е. на мировой стандарт. Проведенная «стандартизация» заболеваемости РШМ показала, что она несколько выше по отношению к «грубому» показателю и составляет $10,5 \pm 0,120/0000$, т.е. уровень заболеваемости достаточно высокий (рис.1).



Вывод. Таким образом, анализ возможностей каждого уровня диагностики показал, что проблему раннего выявления злокачественных опухолей можно решить разработкой новых технологий, включающих в себя комплекс методов, характеризующих отдельные стороны патологического процесса и организацией их применения.

Список литературы:

1. Рахимджанов, А. Р., et al. "Роль синдрома вегетативной дистонии в генезе доинсультных форм цереброваскулярной патологии у женщин молодого возраста." Журн. неврол. и психиатрии им. СС Корсакова 6 (1997): 19-21.