

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФРАКСИПАРИНА ПО СРАВНЕНИЮ С ГЕПАРИНОМ В ЛЕЧЕНИИ ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ

Султонова Н.А., Иброхимова Д.Б., Баратов Р.Ф.

Научный руководитель: д.м.н. проф. Негматуллаева М.Н.

**БухГМИ, кафедра «Повышения квалификации врача общей практики»
с курсом «Неотложной помощи»**

Введение Привычное невынашивание беременности к сегодняшнему дню есть и остаётся краеугольным камнем в практическом акушерстве. Она является не только медицинской, психологической но и социальной проблемой, которая касается много женщин по всему миру. В силу отрицательного воздействия данного положения на репродуктивную систему он в дальнейшем сказывается на усугублению патологических процессов в организме женщины. В этой связи доносить следующий плод до оптимального срока становится ещё больше труднее. С каждым выкидышем шанс доносить плод до срока родов становится меньше.

Цель исследования. Изучить эффективность фраксипарина в сравнении с гепарином в безопасности и эффективности самопроизвольных выкидышей.

Материалы методы исследования. Нами было обследовано в общей сложности 79 женщин, которые обращались в Бухарский областной перинатальный центр города Бухары в период с 2019 по 2020 год. У всех женщин было в анамнезе 3 или более последовательных самопроизвольных аборт. Пациентки были разделены на две группы : I-группа 34 женщин получавшие фраксипарин вокруг пупка в дозе 40 мг один раз в день. II-группа 45 женщин получавшие антикоагулянтную терапию стандартным гепарином вокруг пупка в дозе 4000 единиц 1 раз в день. Статистическая обработка была произведена по методу Фишеру-Стьюдента с помощью пакета Statistica.

Результаты исследования. 27 женщин в I-группе (80%) и 30 женщин во II- группе (66,67%) родили жизнеспособного ребенка ($P = 0,243$). Между двумя группами не было значительных различий в осложнениях беременности или неонатальной заболеваемости. Ни в одной из групп не было случаев чрезмерного кровотечения, тромбоцитопении или остеопоротических переломов. Но при применении фраксипарина процент живорождаемости выше чем при применении гепарина.

Заключение: Следуя данным результатам можно сказать, что применение фраксипарина оказывает более высокий результат по сравнению со стандартным гепарином, что проявляется в лучшем проявлении живорождения.

Список литературы:

1. Рузиева, Н. "Характеристика некоторых предикторов невынашивания беременности." Журнал вестник врача 1.2 (2019): 89-92.
2. Улугов, А. И., М. Б. Деворова, and А. Н. Файзиев. "К ВОПРОСУ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ В АСПЕКТЕ ПЕДИАТРИИ." Medicus 2 (2019): 42-44.