

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МАТЕРЕЙ- ПОДРОСТКОВ И ЖЕНЩИН БЛАГОПРИЯТНОГО ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Хамдамова Г. Б., 502 -группа факультет 1 педиатрии и народной медицины

Научный руководитель: ассистент Ходжиметова Ш.Х.

ТашПМИ, кафедра Неонатология

Актуальность. Дети и подростки являются одной из наиболее уязвимых социальных групп населения, а их здоровье - предметом социального рассмотрения.

Цель: Изучить медико-социальные факторы, влияющие на репродуктивное здоровье матерей- подростков и женщин благоприятного фертильного возраста.

Материал и методы. Обследовано 50 матерей новорожденных детей, которые были разделены на группы. В I группе(основной) - 30 юных матерей в возрасте 16-19 лет. Во II группе(контрольной)- 20 матерей с оптимальным фертильным возрастом (20-30 лет).

Результаты исследования. Социальный статус семьи оценивался по критериям образованности матерей и занятости трудом. Исследования социального статуса матерей показали, что, среди обследованных основной группы в сравнении с контрольной группой было больше «домохозяек» (в 1,5 раза), и значительно меньше работающих женщин (3,5 раза), количество студенток в обеих группах было одинаково (по 10%).

Анализ образованности матерей выявил, что среди юных у 13,3% женщин имелись не законченное среднее, 33,3% среднее, 46,7% специально - среднее и 6,67% не законченное высшее образования, а в контрольной почти половины (45,0%) матерей имели высшее образования, 30,0% специально - среднее образования. В зарегистрированном браке состояли только 66,7% юных матерей, в «гражданском браке» - 13,3%, а также 13,3% женщин были «матерями-одиночками» (в контрольной группе соответственно в 95,0%, 5,0%, одиноких матерей не было). У 76,7% юных женщин беременность была первой, у 20,0% - второй, у 3,33% третьей. У 13,3% женщин в анамнезе имелись самопроизвольные выкидыши, у 6,67% искусственные аборт и у 3,33% - антенатальная гибель плода. Среди женщин зрелого возраста первой беременность была у 25,0%, второй у 45,0% и у 30,0% третьей и более. Перворожавшими среди них были 35,5% женщин, повторно рожавшими - 50,0%, многорожавшими- 15,0 %. В контрольной группе самопроизвольные выкидыши в анамнезе имелись у 15,0% женщин, искусственные аборт у 20,0% и у 5,0% антенатальная гибель плода.

Вредные привычки чаще отмечались у юных женщин (10,0%), чем у женщин благоприятного репродуктивного возраста (5,0%).

Среди юных матерей 2(6,67%) женщин отказались от своего ребенка в роддоме. Одной из важнейших характеристик неподготовленности юных женщин к выполнению материнских функций является тот факт, что среди юных беременных каждая вторая впервые обратилась в женскую консультацию в поздние сроки беременности. С 12 - й по

23-ю неделю - 16(53,3%), а после 24 нед - 3(10,0%); своевременно (до 12 нед беременности) обратились только - 6 (20,0%) женщин. У 5(16,7%) женщин ни разу не обращались в женскую консультацию. В контрольной группе 12(60,0%) женщин своевременно обратились в женскую консультацию, с 12-й по 23 - ю неделю - 8(40,0%) женщин.

Выводы. Таким образом, что социальное положение юных матерей значительно ниже, чем у матерей контрольной группы, так как, среди них подавляющее большинство составляют домохозяйки, значительную часть составляют матери одиночки. Среди юных матерей отмечается низкая своевременная обращаемость в женскую консультацию и у подавляющего большинства женщин выявлена поздняя обращаемость, а более 16% из них вообще не обращались и не вставали на учет у гинеколога и их беременность протекала без медицинского контроля.

Список литературы:

1. Рузиева, Н. "Характеристика некоторых предикторов невынашивания беременности." Журнал вестник врача 1.2 (2019): 89-92.
2. Рузиева, Н. Х., and Д. Э. Назарова. "Изменения биофлоры гениталий у женщин репродуктивного возраста." Международная научно-практическая конференция. 2016.
3. Улугов, А. И., М. Б. Деворова, and А. Н. Файзиев. "К ВОПРОСУ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ В АСПЕКТЕ ПЕДИАТРИИ." Medicus 2 (2019): 42-44.
4. Рахимджанов, А. Р., et al. "Роль синдрома вегетативной дистонии в генезе доинсультных форм цереброваскулярной патологии у женщин молодого возраста." Журн. неврол. и психиатрии им. СС Корсакова 6 (1997): 19-21.