

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА ПРИАРАЛЬЯ

РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

О.А. Атаниязова, Г.Д. Атаниязова
Нукусский филиал ТашПМИ, г.Нукус

Радиоволновая хирургия (РВХ) является сравнительно новым методом, который в последнее время широко внедряется в практику гинеколога.

Целью исследования явилось изучение эффективности применения РВХ при помощи аппарата «Фотек» (Россия) в лечении предраковых заболеваний шейки матки в условиях консультативной поликлиники НФРСНПМЦ АиГ.

Материалы исследования. Обработаны результаты клинико-лабораторного обследования 145 женщин репродуктивного возраста, обратившихся в консультативную поликлинику Нукусского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра Акушерства и гинекологии с различными заболеваниями шейки матки. При помощи кольпоскопического и цитологического исследования была выделена группа из 35 женщин нуждающихся в прицельной биопсии с последующим гистологическим исследованием биоптатов. Критериями включения явились кольпоскопическая картина атипической зоны трансформации и цитологическая картина H-SIL / CINII- CINIII.

При помощи радиохирургического аппарата «Фотек» было проведено взятие прицельной биопсии с патологических участков шейки матки с раздельным выскабливанием цервикального канала у 35 пациенток.

Гистологическое исследование удаленных участков шейки матки позволило верифицировать тяжелую дисплазию плоского и железистого эпителия у 4 (8,0%) женщин, умеренную дисплазию в сочетании со слабой у 17 (34,0%). Инвертируемая кондилома шейки матки в сочетании с умеренной дисплазией обнаружена у двух женщин. Атрофия и субатрофия многослойного плоского эпителия в сочетании с хроническими цервицитами - у 7 (14,0%) больных.

Всем пациенткам с тяжелой и умеренной дисплазией проведена радиоволновая конизация. Послеоперационный период протекал гладко. Эпителизация раневой поверхности началась на 10-12 день после конизации. Полная эпителизация наступила на 24-26 дни после операции.

В результате применения радиохирургического лечения 35 больных с различной патологией шейки матки, нами были отмечены преимущества данного метода: минимальное разрушение подлежащих тканей; атравматичный разрез; минимальное кровотечение в ходе операции; отсутствовал глубокий некроз подлежащих тканей; не наблюдался отек тканей, в результате чего не было повышенного раневого экссудата.

СТРУКТУРА ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ПРИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ

О.А. Атаниязова, Г.Д. Атаниязова
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, г.Нукус

Целью исследования явилось изучение структуры заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), у пациенток с предраковыми заболеваниями шейки матки.

В исследование включены 100 пациенток с интраэпителиальными дисплазиями шейки матки различной степени тяжести. У 38 женщин цитологически обнаружены атипические клетки неопределенного значения - ASCUS. При обследовании этих пациенток у каждой третьей – 14 (32%) диагностированы заболевания, передающиеся половым путем: из них у 7 (50,0%) - генитальный хламидиоз, у 5 (35,1%) – уреаплазмоз, еще у 2 (14,3%) – имело место сочетание хламидийной инфекции с уреаплазмозом. У остальных 24 (64,0%) ЗППП не обнаружены.

Среди 26 пациенток с LSIL/CINI у большинства из них – у 20 (76,9%) диагностированы различные инфекции. У 9(45%) из них обнаружен генитальный хламидиоз, у 5 (25,0%) – уреоплазмоз, у 4(20,0%) – сочетание генитального хламидиоза и уреоплазмоза, еще у 4(20,0%) – гарднереллез. Из 13 женщин с цитологически верифицированной интраэпителиальной дисплазией высокой степени тяжести - HSIL/CINII-III, у 9 (69,2%) диагностированы заболевания, передающиеся половым путем: из них у 6 (66,7%) - генитальный хламидиоз, у 3 (33,3%) – уреоплазмоз. У 13 пациенток в ПАП мазке обнаружены атипические клетки неопределенного значения, не исключающие высокую степень атипии (ASC-H). У 8(61,5%) из них диагностированы генитальный хламидиоз и уреоплазмоз. Из 9 пациенток с атипическими железистыми клетками – AGC у 6(66,7%) обнаружены ЗППП. У половины из них диагностированы хламидии, а у остальных – обнаружены *Gardnerella vaginalis*. У пациенток с ASCUS диагностируется генитальный хламидиоз у 50,0%, уреоплазмоз - 35,1%, при LSIL/CINI обнаружен генитальный хламидиоз у 45%, уреоплазмоз - 25,0%, сочетание генитального хламидиоза и уреоплазмоза - 20,0%, еще гарднереллез у 20,0% обследованных. При HSIL/CINII-III определяется генитальный хламидиоз у 66,7%, уреоплазмоз 33,3%, при ASC-H - генитальный хламидиоз и уреоплазмоз отмечается у 61,5% и при атипических железистых клетках – AGC генитальный хламидиоз и уреоплазмоз диагностируется у 66,7% женщин. Проведенное исследование показывает высокую частоту инфекций передаваемых половым путем у женщин с атипическими изменениями шейки матки.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН RESPUBLIKASIDA ONALIKNI VA BOLALIKNI MUHOFAZA QILISH TIZIMIDA ЭРИШИЛГАН ЮТУҚЛАР

Д.Ж. Бекбаева

Қорақалпоғистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги, Нукус ш.

Қорақалпоғистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимида Республика ихтисослаштирилган Акушерлик ва гинекология илмий Амалий медицина маркази Нукус филиали, Республика болалар кўп тармоқ тиббиёт маркази, Республика шошилинч тез тиббий ёрдам илмий маркази Нукус филиали, шаҳар ва барча туман тиббиёт бирлашмаларида 16 та туғруқ бўлимлари ва болалар бўлимларида, 26 оилавий ва кўп тармоқли поликлиникалари ва 188 та қишлоқ врачлик пунктларида, 279 акушер- гинеколог, 18 болалар гинекологи, 302 педиатр, 64 неонатологлар ва 1417 нафар акушеркалар аҳолига оналикни ва болаликни муҳофаза қилиш ишлари юзасидан хизмат кўрсатиб келмоқдалар.

Тиббиёт ходимларининг энг аҳамиятли вазифаларидан бири - Давлат дастурлари буйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарорлари 2014 йил 1-августдаги “2014-2018 йилларда Ўзбекистонда аҳолининг репродуктив саломатлигини мустаҳкамлаш, оналар, болалар ва ўсмирлар соғлиғини муҳофаза қилиш борасидаги Давлат Дастури тўғрисида”ги ПҚ-№2221-сонли Қарори буйича ҳар бир тиббиёт ходими ўз олдиларига “хомиладорларга, туккан аёлларга, чакалоқларга тиббий ёрдам кўрсатиш ҳамда она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш тизимини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш, ҳар бир шаҳар ва туманларда соғлом бола туғилиши ва тарбияланиши учун зарур шарт-шароитларни яратиш ва мамлакатимизда амалга оширилаётган ишларни янада кучайтириш ва уларнинг самарадорлигини ошириш, шунингдек тиббиёт муассасалари ҳамда жамоат ташкилотлари томонидан кенг ишлар, шу жумладан оилада ва жамиятда репродуктив саломатликни мустаҳкамлаш, жисмоний ва маънавий баркамол авлодни шакллантириш вазифалари” ни мақсад қилиб қуйиб, шу буйича ишлар олиб борилмоқдалар.

Республика бўйича туғиш ёшидаги аёллар, ўсмирлар ва болаларни соғломлаштириш тадбирлари, жумладан 2-босқичли “Соғломлаштириш ҳафталиклари”ни ташкил қилиш, никоҳдан олдин тиббий кўрикдан ўтказиш, болалар орасида юкумли касалликларни тарқалишини олдини олиш мақсадида тасдиқланган календарь бўйича эмлаш тадбирлари, бирламчи бўғинда аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизмат сифатини яхшилаш мақсадида қишлоқ врачлик пунктларини намунавий ҚВПларига айлантириш, уларнинг ва туғруққа ёрдам берувчи ва болалар муассасаларининг материал-техник базасини мустаҳкамлаш, шунингдек аҳоли ўртасида микронутриент етишмовчилигини олдини олиш, хомиланинг ривожланишидаги нуқсонларни эрта аниқлаш мақсадида хомиладорларни скрининг текширувидан ўтказиш тадбирлари давом этмоқда.