

ЯНГИ ТУГИЛГАН БОЛАЛАРДА УЧРАЙДИГАН МУКОВИСЦИДОЗНИНГ ИЧАКШАКЛИНИ УЧРАШ ДАРАЖАСИ ВА ИММУНОГИСТОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

*Баратаева Лола Алимовна.
²Рахмонова Шахноз Каххоровна*

¹ *Тошкент Педиатрия тиббиёт институти, Тошкент, Ўзбекистон*

² *Тошкент давлат стоматология институти, Тошкент, Ўзбекистон*

Муковисцидоз ёки кистозли фиброз ёки Ландштейнера- Фанкони касаллиги наслий системали аутосом-рецессив типда ирсийланувчи экзокринопатия булиб, эрта нафас тракти, ошқозон ичак системаси ва бошқа аъзоларнинг манифестацияли клиник куриниши билан характерланувчи касалликдир. Янги тугилган болаларда учрайдиган жами касалликларнинг орасида муковисцидоз касаллиги ҳар 2 минг боланинг 1 тасида учрайди. Ушбу касалликнинг 3 тури: упка, ичак ва аралаш турлари фарқланади. Тадқиқотларга қура муковисцидознинг фақат ичак шакли жами ҳолатларнинг 5% ни ташкил этади. Бу генетик касаллик ирсийланади ва регионар тарқалиш хусусиятига эга. Статистик маълумотларга қура, Европа давлатида муковисцидознинг ичак шакли катталар ва болаларда ташхисланиб, бу давлатнинг аҳолисининг 5% ген дефекти бўйича ташувчи ҳисобланади ва янги тугилган болаларда касаллик келиб чиқишига замин яратади.

Одам организмида юзага келувчи патологик узгаришларнинг сабаби экзокрин безлардаги ишлаб чиқарилган секретнинг қуюқлашгандир. ВОЗ маълумотларига қура янги тугилган болаларда касалликнинг тарқалиши 1:600 дан 1: 1200 курсаткичи ташкил этади. Муковисцидоз касаллигининг учровчи шакллари ушбу нисбатда учрайди:

- ЕУпка шакли- 15-20% (бошқа аъзоларда клиник белгисиз)
2. Аралаш шакли 35-40 % (упка ва бошқа аъзоларнинг шикастланиши билан)
3. Ичак шакли - 55%.

Муковисцидоз аутосом-рецессив типда ирсийланиб, ок танли аҳолининг CFTR полипептид гени мутацияси ва бу геннинг 7-хромосоманинг узун елкасида жойлашиши ва муковисцидозли мембранаассоцияловчи оксил кодланиши билан характерланади.

Энг қуп тарқалган ген шакли F508del булиб, 85% аллел холида учрайди.

Муковисцидоз касаллигида сурункали яллигланиш жараёни про- ва яллигланишга Қарши цитокинларнинг дисбаланси ҳисобига ушлаб турилади. Бунини болаларда утказилган текшириш асосида исботлаш мумкин. Яъни болаларда кистоз фиброз касаллиги билан про- ва яллигланишга қарши цитокинларнинг орасидаги номутаносиблик қайд этилади: айниқса қуқ йиринг таёқчали инфекция *Pseudomonas aeruginosa* билан оғриган болаларда ИЛ-10 и ИЛ-4ларнинг пасайиши фонида ИЛ-1р ва ФНО-а алар ошади. (ТНЦ СО РАМН Тиббий генетика илмий-тадқиқот институти бази, Томск, Сибирь давлат тиббий университети Марказий гематологии, иммунологии и морфология илмий тадқиқот лаборатория бўлимида)

Хулоса: Ташхис натижаларига қура муковисцидознинг упка, ичак ва аралаш шакллари орасида энг қуп учраш тури ичак шакли эканлиги исботланди. Шу нарса курсатадики, бу болалар орасида у^{лим} ҳолатини қучайтириб, жараённинг тез ривожланишига сабаб бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Begmanov, S. A., Z. S. Shakhobutdinov, and G. A. Khakimova. "Morphological And Some Functional Changes In Animals At Poisoning With Mouthroom." Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12.9 (2021).
2. Begmanov, S., Zokirov, Y., Abidova, N., Khakimova, G., & Shakhobutdinov, Z. (2020). Age-Related Features of Mast Cell Reactivity in Allergies. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, 14(4).