

4. Хасанова, Г. М. "ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ АДИПОНЕКТИНА И ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ИХ ВКЛАД В ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ." Colloquium-journal. No. 13-2. Голопристанський міськрайонний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости, 2020.
5. Исаханова, Нигора Хикматовна. "КЛИНИКА-ПАТОГЕНИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЛИ ВИТАМИНА Д У ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ." Colloquium-Journal. No. 7-2. Голопристанський міськрайонний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости, 2020.
6. Ganieva, D. K., et al. "DULY DIAGNOSIS OF URINARY INFECTIONS IN CHILDREN AND ANALYSIS OF MODERN APPROACH TO THE THERAPY." Новый день в медицине 1 (2021): 169-174.
7. Улугов, А. И., and Ж. Ж. Бутаев. "Биофизические свойства мембраны эритроцитов при респираторных аллергических заболеваниях у детей." Врач-аспирант 62.1.4 (2014): 556-561.

BOLALARNI GRIPGA QARSHI EMLASH SAVOLLARI VA COVID-19 PANDEMIKASI DAVRIDAGI O'SMIRLAR

Toirova N.N.

Toshkent pediatriya tibbiyot institute, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent

Dolzarbligi. O'tkir respirator virusli kasalliklar orasida gripp klinik ko'rinishlari, asoratlarning chastotasi va salbiy oqibatlariga olib kelishi bo'yicha eng og'ir infektsiya hisoblanadi. COVID-19 pandemiyasi davrida nafas yo'llarining gripp viruslari va SARS-CoV-2 bilan bir vaqtda yuqishi kasallikning yanada og'ir kechishiga olib kelishi va asoratlar xavfini oshirishi mumkin.

Maqsadi. Bolalar klinikasi shifokorlari, o'smirlar va bolalar klinikasi bemorlarining ota-onalari o'rtasida grippga qarshi emlash bo'yicha xabardorlik va majburiyat darajasini baholash.

Material va uslublari. 2022-yilda ToshPTI klinika shifokorlari (30 kishi), o'smirlar (30 kishi) va bolalar poliklinikasi bemorlarining ota-onalari (100 kishi) o'rtasida o'tkazilgan so'rov tahlili o'tkazildi.

Natijalar va muhokamasi. O'rganish natijalariga ko'ra, pediatrlar orasida grippga qarshi emlashning O'zbekiston Milliy profilaktik emlashlar taqvimiga kiritilishi to'g'risida xabardorlik darajasi.

Klinikalar o'rtasida xabardorlik darajasi 97% ni tashkil etdi, ota-onalar va o'smirlar o'rtasida xabardorlik darajasi sezilarli darajada past - mos ravishda 33 va 23%. Bolalar poliklinikasi shifokorlari orasida grippga qarshi emlashga rioya qilish 100% ni tashkil etdi va ota-onalar va o'smirlar orasida sezilarli darajada farq qildi - mos ravishda 74 va 63%. 2022 yilda ToshPTI klinikasida bolalarni grippga qarshi emlash bilan qamrab olish darajasioylikdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda - 10%; 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda - 41%; 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilari orasida - 83%; kasb-hunar maktablari va texnikumlarda tahsil olayotgan 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar orasida - 12%.

Xulosa. Bolalar poliklinikasi shifokorlari grippga qarshi emlash bo'yicha yuqori darajadagi xabardorlik va majburiyatlarni ko'rsatdi; O'smirlar va ota-onalar orasida grippga qarshi emlash haqida xabardorlik va rioya qilishning past darajasi aniqlandi. Pandemiya davrida COVID-19 Bolalar va o'smirlarni grippga qarshi emlash bilan qamrab olish darajasini oshirish uchun o'smirlar va ota-onalar o'rtasida sog'lomlashtirish ishlarini kuchaytirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Махкамова, Гулноза Тураходжаевна, and Эльмира Амануллаевна Шамансурова. "Чувствительность пневмококков к антибиотикам у детей с пневмониями на фоне антибактериальной терапии." Медицина: теория и практика 4.S (2019): 357-357.
2. Улугов, А. И., Маърифат Деворова, and К. К. Бобониязов. "Особенности нарушения реологических свойств крови при респираторных аллергических заболеваниях у детей." in Library 4.4 (2014): 19-22.
3. Деворова, Маърифат. "К вопросу оценки физического развития детей, страдающих аллергической патологией." in Library 21.3 (2021): 41-47.
4. Хасанова, Г. М. "ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ АДИПОНЕКТИНА И ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ИХ ВКЛАД В ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ." Colloquium-journal. No. 13-2. Голопристанський міськрайонний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости, 2020.
5. Исаханова, Нигора Хикматовна. "КЛИНИКА-ПАТОГЕНИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЛИ ВИТАМИНА Д У ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ." Colloquium-Journal. No. 7-2. Голопристанський міськрайонний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости, 2020.
6. Шайхова, М. И., and Д. И. Каримова. "Изучение частоты встречаемости аллергических заболеваний у детей школьного возраста с гельминто-протозойной инфекцией." Forcipe 2.S3 (2019): 64-64.
7. Улугов, А. И., and Ж. Ж. Бутаев. "Биофизические свойства мембраны эритроцитов при респираторных аллергических заболеваниях у детей." Врач-аспирант 62.1.4 (2014): 556-561.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИППА У ДЕТЕЙ Г. ТАШКЕНТА В 2023 ГОДУ.

Тоирова Н.Н.

Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Республика Узбекистан, Ташкент

Актуальность. Грипп — одна из самых актуальных проблем здравоохранения. Эпидемии гриппа ежегодно приводят к значительному росту заболеваемости среди взрослых и детей и наносят значительный ущерб экономике страны.

Цель. Изучить клинические и эпидемиологические особенности гриппа у детей г. Ташкента, госпитализированных в 2023 г.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 50 детей в возрасте от 1 мес до 17 лет, госпитализированных с диагнозом грипп в ТашПМК в ноябре–декабре 2023 г. Мальчиков было 23 (46%), девочек — 27 (54%). Этиологический диагноз установлен методом ПЦР носоглоточных смывов.

Результаты и их обсуждение. В этиологической структуре у больных преобладал грипп А (H1N1/09) pd — 46 (92%) случаев, грипп В — у 4 (8%). В возрастной структуре больных дети первого года жизни составили 11 (22%) пациентов, дети в возрасте от 1 года до 3 лет — 12 (24%), дети в возрасте от 4 до 6 лет — 13 (26%) больных, дети старше 7 лет — 14 (28%). Все госпитализированные дети не были вакцинированы от гриппа. Тяжелая форма гриппа установлена у 5 (10%) пациентов, среднетяжелая форма — у 45 (90%). У всех больных тяжелой формой гриппа была выявлена фоновая патология. Клиническими