

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ МЕТОДОМ РЕСТАВРАЦИИ

Махсумова И.Ш., Шухратова Н.

Ташкентский государственный стоматологический институт.

shukhratova0121@mail.ru

Современные данные о развитии кариеса зубов приводят к пониманию того, что кариес является не конечной точкой, а динамическим процессом, который может быть остановлен или обращен вспять на ранних этапах обращения к врачу. По этой причине не прекращается поиск новых путей лечения и профилактики заболевания. Кариес зубов у детей раннего возраста является серьезной проблемой для здравоохранения в связи с высокой распространенностью заболевания и низкой эффективностью проводимых лечебно-профилактических мероприятий.

Цель. Оценка эффективности лечение кариеса зубов у детей от 2 до 6 лет методом реставрации стеклоиномерным цементом Fuji-9 и Цемион.

Материалы и методы. В группу исследования входили дети от 2 до 6 лет обратившихся в поликлинику Детской терапевтической стоматологии при ТГСИ с диагнозом поверхностный и средний кариес. В первой группе(18 детей) проводили реставрацию стеклоиномерным цементом Цемион. Вторая группа(20 детей) поверхностный и средний кариес реставрировали с Fuji-9

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования, в первой группе из 18 детей выявлены 10 с диагнозом поверхностный кариес и 8 детей со средним кариесом, в которой провели реставрацию с помощью Цемион. А во вторую группу входили 20 детей из них 16 со средним кариесом и 4 с поверхностным кариесом реставрировали СИЦом, Fuji-9. Для оценки эффективности реставрации были получены следующие результаты: первой группе через 5 месяца с рецидивом кариеса обратились 5 детей, с жалобами на отсутствие пломбы обратились 4 пациента. Во второй группе через 5 месяца вернулись 3 пациента на отсутствие пломбы.

Выводы. По наблюдениям отдаленных результатов можно прийти к выводу, что у детей от 2 до 6 лет лечение поверхностного и среднего кариеса целесообразно проводить с стеклоиномерным цементом Fuji-9. Он показал наиболее эффективное лечение и реставрацию молочных зубов у детей по сравнению с Цемионом.

Литература:

1. Melkumyan, Timur V., Anjela D. Dadamova, and Khaidar P. Kamilov. "The influence of a hemostatic agent on adhesion strength and microleakage of composite resin restorations." *IJBM* (2018): 355
2. Мелькумян, Т., Каххарова, Д., Камиллов, Н., & Дадамова, А. (2016). Время экспозиции адгезива как фактор срока службы композитной реставрации. *Stomatologiya*, 1(1 (62)), 27-31.
3. Мелькумян, Т., et al. "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА И ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ПАКУЕМЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ." *Stomatologiya* 1.3 (76) (2019): 14-17.