

значительные различия между длиной микроимплантатов и частотой успеха; 6 мм - 72,2%, 8 мм - 90,2%.

Выводы: Результаты показывают, что микроимпланты подходят в качестве альтернативного ортодонтического крепления. Мы рекомендуем использовать 8-миллиметровые микроимплантаты предпочтительнее, чем 6-миллиметровые.

Библиография

1. Tulyaganov, Dilshat U., et al. "In Vivo Evaluation of 3D-Printed Silica-Based Bioactive Glass Scaffolds for Bone Regeneration." *Journal of Functional Biomaterials* 13.2 (2022): 74.

2. Нигматов, Р., Арипова, Г., Муртазаев, С., Насимов, Э., & Рузметова, И. (2014). Определение цефалометрических норм узбекской популяции (населения Узбекистана). *Stomatologiya*, 1(3-4 (57-58)), 73-78.

3. Шомухамедова, Ф., Д. Сулейманова, and Г. Муротова. "ОЧИК ПРИКУСЛИ БЕМОРЛАРИ ТАШХИСИ ВА УЛАРИ ОРТОДОНТИК ДАВОЛАШ." *Медицина и инновации* 1.4 (2021): 442-446.

4. Клёмин, В., Ирсалиев, Х., Кубаренко, В., Нигматов, Р., & Глинкин, В. (2016). Условно-съёмные зубные протезы. *Stomatologiya*, 1(2-3 (63-64)), 43-49.

5. АРИПОВА, ГАВХАР ЭРКИНОВНА, and ШАХНОЗА РАСУЛЖАНОВНА РАСУЛОВА. "ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ДИСТАЛЬНЫМ ПРИКУСОМ С УЧЁТОМ ТИПА РОСТА ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ." *МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко* 11.S1 (2022): 414-415.

ПРЕДОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОСТЕОМИЕЛИТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.

Батырова С.З. магистр 1 курса фак. Гос.Орт. стом. ТГСИ

Научный руководитель: д.м.н. доцент Сафаров М.Т., Phd Бобамуратова Д.Т.

*Ташкентский Государственный стоматологический институт,
Узбекистан*

Актуальность. В последние 2 года у больных увеличивается количество атипично протекающих остеомиелитов. У таких пациентов выявляются осложнения в виде выраженного остеонекроза, рецидивирующего гнойно-некротическим процессом, дефекты верхней челюсти, пансинуситы. У больных с осложнениями остеомиелита челюсти лечение съёмными зубными протезами составляют трудности из-за анатомических и функциональных нарушений в полости рта.

Цель. Изучение плотности кости верхней челюсти у больных с осложнениями остеомиелита верхней челюсти.

Материалы и методы. Исследование было проведено в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии у 17 больных с диагнозом: остеомиелит верхней челюсти, тромбоз кавернозного синуса. Средний возраст пациентов составил 53 года, из них 11 мужчины (64,7%) и 6 женщины (35,3%).

Всем больным была проведена компьютерная томография. Изучили изменение костей верхней челюсти: провели измерение на срезах общей плотности губчатой структуры костей. Для сравнения использовали показатели костей с физиологической плотностью.

Результаты и их обсуждение. При исследовании с помощью компьютерной томографии показатели свидетельствует о снижении плотности кости, деструкции, утончение стенок пазух и секвестрации кости на поздних стадиях. Плотность средних зон лица у 23,5% больных уменьшилась до 100 НУ, у 58,8% составляет 200 НУ, у 17,6% плотность составляет 300 НУ.

Заключение. По проведенным исследованиям выявлено, что плотность кости у 14 (82,3%) пациентов с осложнением остеомиелита верхней челюсти не позволяет выполнить ортопедическое лечение из-за снижения плотности (>300 НУ) ниже допустимого для ортопедического лечения.

1. Арипова, Г., et al. "РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ У ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С УЧЕТОМ ТИПА РОСТА ЧЕЛЮСТЕЙ." Медицина и инновации 1.4 (2021): 421-425.

2. Арипова, Г. Э., et al. "ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ В ПЕРИОД СМЕНЫ ПРИКУСА."

3. Шомухамедова, Ф., Д. Сулейманова, and Г. Муротова. "ОЧИК ПРИКУСЛИ БЕМОРАЛНИ ТАШХИСИ ВА УЛАРНИ ОРТОДОНТИК ДАВОЛАШ." Медицина и инновации 1.4 (2021): 442-446.

4. Bos, Kirsten I., et al. "A treponemal genome from an historic plague victim supports a recent emergence of yaws and its presence in 15th century Europe." 23rd Paleopathology Association European meeting, August 25-29, 2022, Vilnius, Lithuania: abstract book. Vilnius University Press, 2022.

5. АРИПОВА, ГАВХАР ЭРКИНОВНА, and ШАХНОЗА РАСУЛЖАНОВНА РАСУЛОВА. "ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ДИСТАЛЬНЫМ ПРИКУСОМ С УЧЁТОМ ТИПА РОСТА ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ." МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко 11.S1 (2022): 414-415.