КЎП СОНЛИ АДЕНТИЯСИ МАВЖУДБОЛАЛАРДАТИШПРОТЕЗЛАШГАЁНДАШУВ.

Арипова Г.Э., Муртазаев С.С., Муратова Г.А.
Ташкент давлат стоматология институти, Ўзбекистон

Долзарблиги. Эктодермал дисплазиядаги кўп сонли тишлар йўқлиги Н.В.Бондарец маълумотларига кўра: 6-тадан кам йўқотилган тишлар- 54.2%, 6-таданкўптишларнингйўқотилганлигиэса- 25.1 %ташкил қилади.С.Х.Агаджанян (1985) бўйича 2-та тишнинг йўқлиги - 48.5%, 4-та тишнинг йўқлиги- 15.9%,5-10-та тишларнинг йўқлиги- 15.3%, 10-та тишданкўпйўқотилса 20.3% ни ташкил этади.Шунгаасосан, эктодермал дисплазияликўп сонли адентияси бор болаларни ташхислаш ва комплексдаволашдолзарбхисобланади.

Мақсад. Кўп сонли адентиялиболаларда тиш протезлашнинг ўзигахосхусусиятлари.

Материал ва усуллар. ТДСИ Ортодонтия кафедрасига мурожат қилган кўп сонли адентияси мавжуд эктодермал дисплазияли 7 нафар 6 ёшдан 14 ёшгача бўлган болаларда клиник, рентгенологик, антропометрик, фотометрик ва статистик текширишлар ва махсус протетик даволашўтказилди. 14 нафар тенг ёшлик соғлом, аммо тиш қаторларида қисман адентияси мавжуд болалар назорат гурухи сифатида олинди.

Натижалар. Туғмаэктодермалдисплазияси бор болаларданазорат гурухига нисбатан кескинюз морфологияси ўзгариши борлиги хисобига комплекс даволаш жараёнида ортопедиктикланиши ўзига хос ўтказилди. Назорат гурухидаги протезлашнинг анъанавий усулидан фарқланган холда, клинико-лаборатор босқичларини такомиллаштирилди, юз пропорциялари оптималтикланди. Функционал чайнов самарадорлиги ошгани объектив белгилар билантасдиқланди. Юзнинг симметриялари ва эстетик кўринишлари Ильина-Маркосян бўйичаижобий ўзгариш берди. Болаларнингпсихо-эмоционалхолатибиз томондан таклиф этилган 10-баллик эстетик бахолаш шкаласи ёрдамида назоратга олинди.

Хулоса. Туғма эктодермалдисплазиялик адентиясибор болалардапротезлашжараёнини оқилонаамалга оширилди. Таклиф этилган 10-баллик эстетик бахолаш мезони, протезлашбосқичларини такомиллаштириш, морфологик бутликни яратиш, альвеоляр ўсиқларни протез томондан самарали функционал юклантириш каби ўзгаришларгаэришиш учун замин яратди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Zakirovich Dusmukhamedov, and Saidazim Saidagzamovich Murtazaev. "Ethnic aspects of orthognathic bite." European science review 7-8 (2015): 80-84.

2. Хабилов, Н. Л., Ф. А. Шаамухамедова, and Г. Э. Арипова. "Ортодонтия с детским зубным протезированием." Ташкент, 2016.–218 с (2016).

3. Kovalenko, L. I., et al. "DARST. UND TRENNUNG VON EXO- UND ENDO- 1, 3- DIMETHYL- BICYCLO (2, 2, 1) HEPTAN." Chemischer Informationsdienst. Organische Chemie 1.33 (1970): no-no.

4. Клёмин, В., Нигматов, Р., Кубаренко, В., Глинкин, В., & Ирсалиев, Х. (2016). Условно-несъёмные зубные протезы. Stomatologiya, 1(2-3 (63-64)), 36-42.

5. Флейшер, Григорий. Пропедевтика детской ортопедической стоматологии. Руководство для врачей. Litres, 2022.

6. Расулова, Ш., et al. "Построение математической модели с учётом зависимости длины переднего отрезка зубных рядов и ширины верхних резцов (по Корхаусу)." Stomatologiya 2 (83) (2021): 44-46.