

УДК: 618.16-002.154+616-08-039.73

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ДИСТРОФИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВУЛЬВЫ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ**Ж.А. АБДУРАХМАНОВ, М.Н. КАРИМОВА, Ф.М. ОРИФОВА, М.Р. ОРИПОВА,  
Х.У. ОРТИКОВА, Б.С. САИДКУЛОВ

1-Самаркандский Филиал Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии;

2-Самаркандский Государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Самарканд

**ВУЛЬВА ДИСТРОФИК КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН ТУРЛИ ЁШДАГИ БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШДА КОМПЛЕКС ЁНДАШУВ**Ж.А. АБДУРАХМАНОВ, М.Н. КАРИМОВА, Ф.М. ОРИФОВА, М.Р. ОРИПОВА,  
Х.У. ОРТИКОВА, Б.С. САИДКУЛОВ

1 - Республика Ихтисослаштирилган Онкология ва Радиология Илмий Амалий Маркази Самарканд филиали;

2 – Самарканд Давлат медицина институти, Ўзбекистон Республикаси, Самарканд шаҳри

**COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH DYSTROPHIC DISEASES OF VULVA IN DIFFERENT AGE GROUPS**D.J.A. ABDURAHMONOV, M.N. KARIMOVA, F.M. ORIFOVA, M.R. ORIPOVA,  
H.U. ORTIKOVA, B.S. SAIDKULOV

1 - Samarkand branch of the Republican specialized scientific and practical center of oncology and radiology;

2 - Samarkand State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Samarkand

*Ташиқи жинсий аъзолар териси ва шиллиқ қавати ўсма олди касалликларига вульва дистрофик касалликлари кириб, шулардан 20-60% ҳолатларда вульва раки келиб чиқади. Текишириш учун олинган маълумотлар вульва дистрофик касалликлари билан даволанган 50 та беморда ретроспектив тахлил учун танланган. Вульва дистрофик касалликлари гормонотерапия билан ўтказилган медикаментоз даво ва криодеструкция усулида даво ўтказиши натижасида репродуктив ёшидаги аёлларда анча эффе́ктив натижа олинган. Климактерик ва менопауза ёшидаги аёлларда эса гормонотерапиясиз ўтказилган медикаментоз даводан эффе́кт бўлмаганлиги сабабли кўпчилик ҳолатларда оператив даво усули қўлланилади.*

**Калит сўзлар:** Крауроз, лейкоплакия, вульва, дистрофия, менопауза, қичишиш, криодеструкция.

*The premalignant diseases of the skin and mucosa of external genitalia are dystrophic diseases of the vulva against which in 20-60% of cases there is cancer. The material of this study selected a retrospective analysis of 50 patients treated for dystrophic diseases of the vulva. As a result of the treatment of dystrophic diseases of the vulva in women of reproductive age, drug treatment with hormone therapy (local and general use) and cryodestruction, is a more effective and minimally invasive method. In menopausal age and climacteric age in women due to of the in effectiveness of drug treatment without hormone therapy in most cases leads to the application of surgical intervention.*

**Keywords:** Kraurosis, leukoplakia, vulva, dystrophia, menopause, itching, cryodestruction.

**Введение.** К предопухолевым заболеваниям кожи и слизистой оболочки наружных половых органов относятся дистрофические заболевания вульвы, на фоне которых в 20-60% случаев по данным различных авторов возникает рак [2, 3, 4, 5, 6]. Снижение содержания стероидных гормонов на фоне нарушения их гомеостаза играет важную роль в возникновении дистрофических процессов вульвы [2, 3, 6]. По данным многих авторов [1, 3, 5, 6] у больных дистрофическими процессами и раком вульвы обнаружена высокая частота гипертонической болезни, атеросклероза, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, заболевания печени, то есть заболеваний вследствие нарушенного обмена веществ. Лечение дистрофических заболеваний

вульвы относится к числу наиболее сложных и нерешенных проблем [3].

**Цель исследования:** Улучшения результаты лечения больных с дистрофическими заболеваниями вульвы в различных возрастных группы, путем выбора оптимального метода воздействия.

**Материалы и методы:** Материалом данного исследования выбран ретроспективный анализ 50 больных, лечившихся по поводу дистрофического заболевания вульвы в Онкогинекологическом Отделении Самаркандского филиала РСНПМИОиР за период с 2011 по 2016 года. Всем больным был установлен диагноз на основании клинических данных, гинекологического статуса, вульвоскопии, цитологического и гистологического исследования биоптата из вульвы.

Возраст больных составило от 35 до 62 лет и в зависимости от возраста разделены на две группы. В первую группу входили больные в возрасте до 45 лет (репродуктивный возраст) составило 22 (44%), а вторую группу климактерического и менопаузы 28 (66%) больных. После установления диагноза дистрофического заболевания вульвы, больным более молодого возраста вначале проведена блокада (цефазалин 1,0+ 50мл 0,5% новокаин) область срамного сплетения, гормонотерапия (эстроген и прогестерон содержащие) с последующем при неэффективности консервативного медикаментозного лечения при ограниченных процессах использовали криодеструкцию жидким азотом. При выраженных поражениях была произведена операция простая вульвэктомия. Больным климактерического возраста и в менопаузе проведено 4 курса медикаментозного лечения - блокада область срамного сплетения без гормонотерапии. При неэффективности медикаментозного лечения была произведена операция – простая вульвэктомия.

**Полученные результаты:** Больным более молодого возраста после 4 курса (каждый курс с 6 месячным перерывом) консервативного лечения – блокада срамного сплетения с гормонотерапией (регулон, регивидон) у 4 (2%) больных, через 2 года выявлено рецидивирование. С целью сохранения репродуктивной и детородной функции больным молодого возраста с рецидивом заболевания произвести оперативное лечение в объеме простой вульвэктомии не было показано, а рецидивированным участкам была произведена криодеструкция тканей вульвы жидким азотом. Эффективность от произведенного медикаментозного лечения, т.е. блокада срамного сплетения без гормонотерапии больным климактерического и менопаузального возраста оказалось значительно низкая. Из 28 больных у 18 (64%) через 8 месяцев наблюдался рецидив. Из-за рецидива была произведена операция в объеме простая вульвэктомия. После операции повторный рецидив наблюдался у 5 (17%) больных, на месте у входа во влагалище и вокруг анального отверстия. На рецидивированных участках неоднократно была произведена криодеструкция жидким азотом.

**Заключение.** Таким образом при лечении дистрофического заболевания вульвы у женщин репродуктивного возраста, медикаментозное лечение с гормонотерапией (местного и общего применения) и криодеструкции, является более эффективным и малоинвазивным методом, не вызывает осложнений и не сопровождается появлением грубых рубцов в области вульвы, с тем самым обеспечивает длительный безрецидивный период заболевания. А у женщин климактерического возраста и менопаузе из-за неэффективности медикаментозного лечения без гормонотерапии в

большинстве случаев приводит к применению оперативному вмешательству, которые часто сопровождается с послеоперационным осложнением и образованию грубых рубцов, поэтому при лечении дистрофического заболевания вульвы требует комплексный подход, учитывая возраст больных.

#### Литература:

1. Virgili A., Lauriola M.M., Mantovani L., Corazza M. Vulvar lichen sclerosus 11 women treated with tacrolimus 0,1% ointment //Acta Dermatol. Venereol.-2007.-№87(1).-P.69-72.
2. Гинекология-национальное руководство под ред. В.И. Кулакова, Г.М. Савельевой, И.Б. Манухина 2009 г.; В.К. Лихачев Практическая гинекология. Руководство для врачей 2007. Дистрофические заболевания шейки матки, влагалища и вульвы.
3. Стаханов М.Л., Вельшер Л.З, Крылова Е.Н. Сочетающее лазерное лечение и реабилитация больных дистрофическими заболеваниями вульвы// Паллиативная медицина и реабилитация. - 2007. -№3. -С.20-41.
4. Кауфман Р., Фаро С., Браун Д. Доброкачественные заболевания вульвы и влагалища. Пер. с англ. М: Издательство Бином, 2009; 320-354
5. Мельниченко Г.А. Ожирение в практике эндокринолога // Русский медицинский журнал. 2012. Т. 9. №2 (121). С. 82-87.
6. Эдвард Д.Ж. Уилкинсон и Кейс Стоун 2009, Заболевание вульвы Клиническое руководство пер. с англ. языка. – 229 с. Маркина Е.И.

#### КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ДИСТРОФИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВУЛЬВЫ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Ж.А. АБДУРАХМАНОВ, М.Н. КАРИМОВА,  
Ф.М. ОРИФОВА, М.Р. ОРИПОВА,  
Х.У. ОРТИКОВА, Б.С. САИДКУЛОВ

К предопухолевым заболеваниям кожи и слизистой оболочки наружных половых органов относятся дистрофические заболевания вульвы, на фоне которых в 20-60% случаев возникает рак. Больным более молодого возраста вначале проведена блокада область срамного сплетения, гормонотерапия. Больным климактерического возраста и в менопаузе проведено 4 курса медикаментозного лечения - блокада область срамного сплетения без гормонотерапии. В результате при лечении дистрофического заболевания вульвы у женщин репродуктивного возраста, медикаментозное лечение с гормонотерапией (местного и общего применения) и криодеструкции, является более эффективным и малоинвазивным методом.

**Ключевые слова:** Крауроз, лейкоплакия, вульва, дистрофия, менопауза, зуд, криодеструкция.