

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ ПРИ КОРОТКОМ КУРСЕ ЛЕЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С

М.Д. Ахмедова, И.А. Имамова, А.Х. Тойчиев, Ж.А. Курбанов

Ташкентская медицинская академия

Цель. Установить клинико-лабораторную эффективность применения гепатопротекторов таких, как Фосфоглив, Стронгер Нео-Минофаген и Гептрал при коротком курсе лечения в комплексной терапии.

Материалы и методы. В клинике НИИЭМИЗ МЗ РУ в динамике клинико-лабораторно обследованы 102(100%) больных, из них 51(50%) хронический вирусный гепатит В (ХВГВ) и 51(50%) хронический вирусный гепатит С (ХВГС) в возрасте от 17 до 77 лет. Диагноз ХВГВ и ХВГС ставился на основании приказа №5 от 5 января 2012г.

Первая группа - 34 (33,33%) больных принимали Фосфоглив. Из них у 17 (50%) ХВГВ и 17 (50%) ХВГС. В среднем больные получали Фосфоглив 10,1 дней по 2,5 гр внутривенно 1 раз в день.

Вторая группа - 34 (33,33%) больных принимали Стронгер Нео-Минофаген. Из них 17 (50%) ХВГВ и 17(50%) ХВГС. В среднем больные получали Стронгер Нео-Минофаген 11,2 дней по 40,0 мл внутривенно 1 раз в день.

Третья группа - 34 (33,33%) больных принимали Гептрал. Число больных 34, из них 17 (50%) ХВГВ и 17 (50%) ХВГС. В среднем больные получали Гептрал 11,8 дней по 400,0 мг внутривенно 1 раз в день.

Результаты и обсуждения. В группе больных исчезновения симптомов у большинства больных наступило в течении 10 дней после приема препарата. Достоверность различий между биохимическими показателями крови до и после лечения составляет: АлАТ до лечения – $1,27 \pm 0,12$, после лечения – $0,79 \pm 0,03$ ммоль/л; общий билирубин до лечения – $26,8 \pm 2,22$, после лечения – $20,85 \pm 0,73$ мкмоль/л; прямой билирубин до лечения – $10,22 \pm 1,77$, после лечения – $5,45 \pm 0,87$ мкмоль/л; непрямой билирубин до лечения – $16,83 \pm 0,8$, после лечения – $15,44 \pm 0,35$ мкмоль/л.

Во второй группе больных, исчезновение болей в правом подреберье и иктеричности кожных покровов у большинства больных наступало в течении 5 дней после приема препарата, слабость и пониженный аппетит держался дольше, до 6-10 дней. Достоверность

различий между биохимическими показателями крови до и после лечения составляет: АлАТ до лечения – $1,48 \pm 0,18$, после лечения – $0,79 \pm 0,03$ ммоль/л; общий билирубин до лечения – $25,9 \pm 2,02$, после лечения – $21,8 \pm 2,03$ мкмоль/л; прямой билирубин до лечения – $8,63 \pm 1,66$, после лечения – $5,24 \pm 1,37$ мкмоль/л; непрямой билирубин до лечения – $17,1 \pm 0,67$, после лечения – $16,6 \pm 0,72$ мкмоль/л.

В третьей группе больных, исчезновение пониженного аппетита и болей в правом подреберье у большинства больных наступало в течении 5 дней после приема препарата, слабость и желтуха держалось 6-10 дней, у 6-10% больных симптомы держались более 11 дней. Достоверность различий между биохимическими показателями крови до и после лечения составляет: АлАТ до лечения – $1,73 \pm 0,18$, после лечения – $0,98 \pm 0,09$ ммоль/л; общий билирубин до лечения – $51,89 \pm 11,8$, после лечения – $28,1 \pm 3,7$ мкмоль/л, прямой билирубин до лечения – $27,7 \pm 7,64$, после лечения – $10,14 \pm 2,82$ мкмоль/л; непрямой билирубин до лечения – $24,74 \pm 4,38$, после лечения – $17,81 \pm 1,03$ мкмоль/л.

Заключение. Установлено, что действие гепатопротекторов на клинико-лабораторные показатели болезни положительны, то есть во всех трех группах больных общее состояние улучшилось, у большей части больных основные клинические симптомы исчезли или уменьшились, лабораторные показатели значительно снизились до нормы. Непереносимость и появление новых симптомов при приеме гепатопротекторов не наблюдалось. Тем не менее, применение гепатопротекторов было в комплексной терапии с другими препаратами, которые также улучшают клинико-лабораторные показатели болезни. Выявлено, что при коротком курсе лечения гепатопротекторами в комплексной терапии трудно определить явную разницу между ними. Поэтому считаем целесообразным, исследовать влияние гепатопротекторов при более продолжительном применении для оценки эффективности и продолжительности действия препарата. Исследования в данной области продолжаются.