

больных с пневмонией. Самые выраженные изменения констатированы в группе больных с неонатальным сепсисом. Сопоставление этиологического фактора показало, что в группе больных с неонатальным сепсисом моноинфекция констатирована в 45 (52,94%) случаях, в группе больных с пневмонией в 8(9,41%), а в группе с ОКИ в 9(10,58%) случаях. В 12(14,11%) случаях констатирован летальный исход. При этом, не было прямой корреляции с показателями интоксикации, что диктует необходимость дальнейших изысканий.

Выводы: Этиологическими представителями нозокомиальных инфекций может быть широкий спектр бактериальных патогенов.

Выраженность эндотоксикоза можно определить доступными методами, применяемыми на уровне любого стационара.

Полноценный анализ по неонатальным нозокомиальным инфекциям невозможен без комплексного подхода, включающего клинико-эпидемиологические и микробиологические данные.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРРА У ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА РАК НОСОГЛОТКИ

А.А. Маматисаев, Д.Б. Юсупова

Ташкентская медицинская академия

Как показывают литературные данные, рак носоглотки в значительной степени связано с вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). Обнаружение ВЭБ в биоптатах может послужить основным и определяющим маркером опухоли.

Цель: Оценить и определить оптимальный метод исследования ВЭБ для улучшения диагностики рака носоглотки.

Материалы и методы исследования: Для оценки чувствительности и специфичности полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммунофлюоресцентного метода, были изучены биопсийные ткани пациентов, у которых подозревался рак носоглотки.

Результаты: Данные исследования показали что, в образцах, взятых у 47 пациентов

с раком носоглотки, ВЭБ была обнаружена методом ПЦР в 36 случаях (76,5%) и иммунофлюоресцентным в 39 случаях (82,9%). В образцах, взятых у 19 пациентов без онкопатологии, ВЭБ была обнаружена методом ПЦР в 3 случаях (15,7%) и иммунофлюоресцентным ни в одном случае не было обнаружено.

Выводы: Результаты показывают, что методом ПЦР, ВЭБ может иногда быть обнаружен и в не неопластических тканях носоглотки, поэтому метод иммунофлюоресценции является очень полезным дополнением в диагностике рака носоглотки. Но, не смотря на убедительные показатели данных методов, требуется продолжение научных исследований.

СЕЗОНЫ ГОДА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТЕНОЗИРУЮЩИХ ЛАРИНГОТРАХЕИТОВ У ДЕТЕЙ

Ф.В. Махмудова, М.С. Атаева, З. Холмурадова, Г. Муртазова

Самаркандский государственный медицинский институт

Актуальность проблемы. Заболевания верхних дыхательных путей особенно широко распространены среди детского населения, при этом они не только наносят вред детскому населению но и приносят колоссальный экономический ущерб государству. Одним из наиболее частых клинических синдромов, встречающихся при острых респираторных вирусных инфекциях у детей, является острый ларинготрахеит. Актуальность проблемы острого ларинготрахеита, особенно стенозирующего, обусловлено не только его высокой распространенностью, но и возможностью развития бактериальных осложнений, которая

угрожает жизни больного и требует экстренного врачебного вмешательства.

Целью работы явилось изучение обращаемости больных с острым стенозирующим ларинготрахеитом за медицинской помощи в зависимости от сезона года в условиях резко континентального климата Узбекистана, в частности по Самаркандской области.

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ 240 историй болезни пациентов, в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, которые находились на стационарном лечении в отделениях детской реанимации, первой и второй экстренной педиатрии Самаркандского