

Для больных, сочетанных с ВГ характерен распространенный специфический процесс с выраженным экссудативно-некротическим характером (инфильтративный туберкулез и туберкулёзный плеврит) воспаления легких и

запущенных форм (фиброзно-кавернозный и диссеминированный туберкулез). При сочетании туберкулеза с ВГ встречаемость лекарственной устойчивости микобактерии туберкулеза превышает.

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ МАРКЕРОВ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

А.И. Мухиддинов, Ф.О. Хасанжанова, Г. Абдиева

Самаркандский государственный медицинский институт

Актуальность: Проблема вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи приобрела в последние годы особую актуальность вследствие резкого ухудшения эпидемической обстановки. Как отмечено заболеваемость вирусными гепатитами В и С трансформировалась из медицинской проблемы в социальную и представляет реальную угрозу для национальной безопасности страны. Одним из существенных аспектов проблемы является недостаточно широкое применение в клинической практике современных методов диагностики, в частности полимеразной цепной реакции (ПЦР), обладающей высокой чувствительностью.

Цель исследования: Выявляемости маркеров вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи у больных с циррозом печени.

Методы исследования: Проведено обследование 64 больного (мужчин - 39, женщин - 25) с предварительным диагнозом «Хронический вирусный гепатит, цирроз печени», включавшее определение в сыворотке крови

ДНК вируса гепатита В (ВГВ) и РНК вируса гепатита С (ВГС) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результаты: У 8 чел. не выявлено ДНК ВГВ и РНК ВГС. Диагноз вирусного гепатита подтвержден у 56 чел. Причем, у 26 чел. в сыворотке крови выявлена только ДНК ВГВ, у – только РНК ВГС, оба теста были положительными у 30 чел. Среди больных вирусными гепатитами преобладали мужчины - 61% против 39% женщин.

Выводы: Таким образом, моноинфицирование установлено у 30 чел. со значительным преобладанием – ВГС над ВГВ. Это соотношение превышает официальные данные заболеваемости свидетельствует о неблагоприятной тенденции дальнейшего преимущественного роста заболеваемости ВГС. Практически у каждого пятого больного хроническим вирусным гепатитом отмечается микст-инфекция ВГВ+ВГС. Поэтому всем больным с подозрением на вирусный гепатит необходимо проводить комплексное обследование.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ

А.И. Мухиддинов, Г.Т. Маджидова, Р. Мирзаев

Самаркандский государственный медицинский институт

Актуальность: Хронические гепатиты, особенно вирусной этиологии, рассматриваются ВОЗ как серьезная проблема общественного здравоохранения, что обусловлено их глобальным распространением, длительным течением, неблагоприятными последствиями. В связи с этим актуальным остается вопрос своевременной диагностики хронических гепатитов как основы адекватной терапии. Ультразвуковое исследование имеет широкое распространение в диагностике заболеваний печени в связи с доступностью, неинвазивностью, отсутствием лучевых нагрузок. Однако вопрос диагнос-

тической ценности данного метода при хронических гепатитах остается открытым.

Цель исследования: Определения размеров, оценки состояния паренхимы печени и наличия признаков портальной гипертензии, определение калибра портальной вены и скорости портального кровотока

Материал и методы: Для поведения исследования были сформированы 3 группы.

В первую группу (здоровые - 3Д) вошли профессиональные спортсмены возрастом 18-26 лет, ведущие здоровый образ жизни, не имеющие клинико-лабораторных проявлений