

Таким образом, проведенные исследования показали, что при сальмонеллезной инфекции в патологический процесс вовлекается не только кишечник, но и желудок, о чем свидетельствует снижение содержания гексозаминов и гексоз и повышение уровня сиаловых кислот, особенно на 7-е сутки развития острой сальмонеллезной инфекции. При хроническом гелиотриновом гепатите наиболее

выраженные изменения защитного барьера слизистой желудка и кишечника регистрируются на 90-е и 120-е сутки эксперимента. Развитие сальмонеллезной инфекции на фоне хронического гелиотринового гепатита способствует более выраженным изменениям изучаемых показателей, особенно на 7-е и 10-е сутки развития сальмонеллезной инфекции.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИХОРАДКИ КУ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. Юлдашев, Х.Р. Хасанов

Ташкентская медицинская академия

Изучение Эпидемиологии лихорадки КУ в Республике Узбекистан начато с 1954 года. Целью настоящего исследования является проведение Ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости лихорадкой Ку для улучшения эпидемиологического надзора за этой инфекции.

Заболеваемость лихорадки Ку носит спорадический и вспышечный характер. Анализируя заболеваемость лихорадки Ку в Ташкентской области за период 1986-2000 гг. установлено, показатели заболеваемости в городах составило 1,2 на 100000 населения, в районах 1,4 на 100000 населения и в целом по области составило 1,3.

Наибольшее число серопозитивных лиц отмечается среди работников мясоперерабатывающих предприятий (4,0 %) и среди животноводов (0,2-0,3%).

Серологический скрининг, проводимый по эпидемиологическим показаниям, выявил

22,1% положительно реагирующих на коксиеллез (24 из 111 обследованного)

При серологическом обследовании 280 контактных в очагах выявлено 24 позитивных на коксиеллез (6,5%). Эпидемиологическим обследованием установлено что основным источником инфекции послужили КРС и МРС. При анализе 300 карт эпидемиологического обследования в 12,1% случаев установлен источник инфекции, среди них КРС-15,5% МРС – 14,1 %. Контактнo-бытовой путь передачи составили 23,3%. Факторам передачи послужили молоко и мясные продукты.

Таким образом за последние годы заболеваемость лихорадкой Ку в Ташкентской области снижается и встречается в виде спорадических случаев, распределение заболеваемости характеризуется преобладанием антропоургического типа очага и основным источником инфекции является МРС и КРС.

ЦЕННОСТЬ ЭХОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ У ДЕТЕЙ

Г.А. Юсупалиева, Ф.И. Иноятова, А.А. Фазылов

*Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Республиканский специализированный научно-практический медицинский Центр Педиатрии,
Ташкентский институт усовершенствования врачей.*

Актуальность. Своевременная диагностика хронических вирусных гепатитов (ХВГ) представляют собой серьезную проблему для педиатрической радиологии и гепатологии.

Цель. Совершенствование диагностики хронических вирусных гепатитов у детей путём применения комплексных технологий эхографии в системе клинико-инструментальных исследований.

Материалы и методы. Нами было обследовано 184 детей с хроническими

вирусными гепатитами (ХВГ), из них 150 (81%) детей с ХГВ, 15 (8%) детей с ХГС, 19 (11%) детей с ХГД. Мальчиков было 102, девочек 82. Все больные находились в РСНПМЦ педиатрии в отделении гепатологии и в клинике ТашПМИ в плановом хирургическом отделении. В обследовании пациентов с хроническими вирусными гепатитами В, С и D использованы клинические, лабораторные и инструментальные исследования.