

ШТЕРНБЕРГА – БОТАНИЧЕСКИЙ ОПИСАНИЕ

Тошпулатов Худоёр Бахтиёрович,

Холмуродов Иброхим Рашидович

Студентов первого курса Фармация КФУ

Джизакского филиала Национального университета Узбекистана

Аннотация: Штернбергия (*Sternbergia*) принадлежит к семейству Амариллисовых. В природе насчитывается 5-8 видов, распространенных в Средиземноморье, горах Крыма и Кавказа. Все они — низкорослые многолетние луковичные растения, внешне похожие на крокусы. Луковицы штернбергии грушевидные, темной окраски. Листья линейные, темно-зеленые, блестящие. Цветы одиночные, воронковидные, насыщенного золотисто-желтого цвета.

Ключевые слова: *Sternbergia*, *Sternbergia lutea*, *Sternbergia macrantha*, *Sternbergia fischeriana*.

Штернбергия — род многолетних луковичных растений с гляцевыми узкими листочками и ярко-лимонными цветками (иногда белоснежными). Растение источает приятный, едва уловимый аромат. В садоводстве штернбергию используют как почвопокровную культуру, располагая под пологом деревьев и кустарников. Благодаря небольшим размерам она хорошо подходит для посадки в альпинариях и рокариях. Как и все луковичные, штернбергия пригодна для срезки.

Штернбергия (лат. *Sternbergia*) принадлежит к семейству амариллисовых. В природе насчитывается 5-8 видов, распространенных в Средиземноморье, горах Крыма и Кавказа. Все они — низкорослые многолетние луковичные растения, внешне похожие на крокусы. Луковицы штернбергии грушевидные, темной окраски. Листья линейные, темно-зеленые, блестящие. Цветы одиночные, воронковидные, насыщенного золотисто-желтого цвета. Цветет штернбергия очень обильно на протяжении сентября — октября, но есть виды, цветущие весной[1]. Листья усиливают рост после цветения, а на юге не прекращают расти и зимой. К концу апреля листья отмирают и растения переходят в период покоя до конца лета.

Южанка штернбергия предпочитает солнечные, защищенные от ветра участки. На зиму ее необходимо укрывать слоем мульчи. Сажать это растение необходимо в плодородную, хорошо дренированную почву на глубину 10 см на расстоянии 15-20 см. В остальном она нетребовательна к условиям содержания, устойчива к болезням, не поражается.

В условиях сада штернбергия не плодоносит, но очень хорошо размножается дочерними луковицами. Делить старые гнезда нужно каждые 3-5 лет, но даже при ежегодном делении растения быстро разрастаются. Дочерние луковицы созревают быстро и начинают цвести уже через 1-2 года. Благодаря высокому коэффициенту размножения штернбергия без особого ухода, за короткий период времени формирует сплошной покров на газоне или под пологом деревьев[2].

В культуре чаще всего выращивают Штернбергию желтую (*Sternbergia lutea*). Также известны штернбергия крупноцветковая (*Sternbergia macrantha*) и штернбергия Фишера (*Sternbergia fischeriana*), цветущая ранней весной. В садоводстве штернбергию используют как почвопокровное растение под пологом деревьев и кустарников. Благодаря небольшим размерам она хорошо подходит для посадки в альпинариях и рокариях. Как и все луковичные штернбергия пригодна для выгонки и срезки.

Штернбергия может произрастать как в открытом грунте, так и в домашних условиях. В районах с суровыми зимами ее лучше выращивать в горшках, занося в дом с началом первых заморозков, где она будет продолжать обильно и длительно цвести. Почва для посадки данной культуры должна быть хорошо дренирована. Самое главное

правило успешного роста и длительного цветения штернбергии – не переусердствовать с поливом. Земля даже после полива должна быть не мокрой, а слегка влажной. Даже однократный перелив может спровоцировать гниение луковицы.

При культивировании в открытом грунте следует выбирать место, где растение будет защищено от сквозняка. На зиму растение лучше утеплить листьями и хворостом или мульчей, если речь идет о культивировании в открытом грунте. Два раза в месяц растение удобряют, чередуя органические и минеральные подкормки.

Род Штернбергия включает 8 видов, однако на сегодняшний день наиболее известны только некоторые из них:

Штернбергия желтая (лат. *Sternbergia Lutea*). Низкорослое растение, вырастает лишь до 15 сантиметров высоту. Данный вид цветет довольно поздно, обычно в конце августа. Цветки насыщенного желтого, яркого оттенка, источают слабый приятный аромат. Листья ремневидные, темно-зеленые, плотные, покрыты восковым налетом. Луковицы круглые, до 3 см в диаметре. Семян штернбергия в культуре не завязывает и размножается только детками, которые высаживают в грунт в сентябре.

Штернбергия крупноцветковая (лат. *Sternbergia Grandiflorum*). Этот вид может вырастать до полуметра в высоту. Подходит для срезки, так как цветки сохраняют первозданный вид до 3 недель. Листья зеленые, линейные. Цветки одиночные, воронковидные, лимонно-желтые, ароматные, диаметром до 6,5 см. Цветет осенью. Не вызывает трудностей в выращивании.

Штернбергия Фишера (лат. *Sternbergia Fischeriana*). Особенностью данного вида является раннее цветение, которое наблюдается в феврале. Совершенно не переносит заморозков, поэтому выращивается только в домашних условиях. Листья длинные, узкие, глянцевые. Цветки ярко-лимонного цвета.

Штернбергия белоснежная (*Sternbergia candida*). Единственный вид штернбергии с белоснежными, а не желтыми цветками. Цветение штернбергии белоснежной приходится на март-апрель. Считается редким видом, сложно встретить в дикой природе.

Список литературы:

1. Артющенко З.Т. Декоративные травянистые растения для открытого грунта СССР. В 2 т. /Н. А. Аврорин. — Л.: Наука, Лен. отд., 1977. — Т. 1. — С. 111-113.
2. Горшкова С.Г. Род 300. Штернбергия — *Sternbergia* // Флора СССР: в 30 т. / гл. ред. В. Л. Комаров. — Л.: Изд-во АН СССР, 1935. — Т. 4 / ред. тома В. Л. Комаров. — С. 485—489.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МОТОРНОЙ АЛАЛИИ

Цикалова Е.А.,

студентка 4 курса специальности «Логопедия»

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого» г. Тула, Тульская область

Научный руководитель: **Асмаловская О.А.,**

старший преподаватель кафедры

специальной психологии

Алалия – это отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка [6].